

PROCEDURE PER ESAMI RM CON MEZZO DI CONTRASTO

Esami propedeutici alla somministrazione endovenosa di mezzi di contrasto per esami di Diagnostica per Immagini, da effettuare non più di 30 giorni prima della data di esecuzione dell'esame. (Linee Guida della Società Italiana di Radiologia Medica (S.I.R.M.), tratte dalla European Society of Urogenital Radiology (E.S.U.R.)). **Esami Ematochimici:**

- Azotemia
- Creatinemia
- Glicemia

Esami strumentali:

- Elettrocardiogramma (refertato)

È inoltre necessario restare a **DIGIUNO** per 4 - 6 ore prima dell'orario di prenotazione; **può** comunque bere **acqua**.

Se la creatininemia $\geq 1,5$ mg/dl : consultare il personale sanitario della Casa di Cura. In caso di insufficienza renale diagnosticata è necessaria una valutazione ematochimica del filtrato glomerulare (G.F.R.). Non sono necessarie precauzioni particolari se i mezzi di contrasto a base di gadolino sono somministrati a pazienti diabetici in terapia con **Metformina**.

Non è possibile sottoporsi all'esame di Risonanza Magnetica in caso il paziente sia portatore di pacemaker, defibrillatori cardiaci, apparecchi endococleari, alcune valvole cardiache e/o stent coronarici (è necessario esibire la documentazione clinica per accertarne la compatibilità con l'apparecchio di Risonanza Magnetica), punti metallici per fissazione della retina, dispositivi ad attivazione magnetica (pompa di infusione per l'insulina).

Si consiglia di evitare l'uso di cosmetici per il viso e l'utilizzo di lacche per capelli.

Si raccomanda di effettuare l'esame di Risonanza Magnetica almeno 2 mesi dopo essere stati sottoposti a procedure chirurgiche.

SI PREGA DI PORTARE CON SE' AL MOMENTO DELL'ESAME EVENTUALI ESAMI PRATICATI IN PRECEDENZA (TC, RM E REFERTI SPECIALISTICI)

SI PREGA DI RIFERIRE EVENTUALI DIATESI ALLERGICHE ANCHE EPISODICHE

DATA ESAME _____ ORA _____